

# Provokationstest/Schwermetallbelastungstest Heimversion

Durchführung: 2x 500mg DMSA Kapseln und 1 EDTA Zäpfchen

## I. Basalurin Untersuchung:

Bei diesem Urintest wird die Metallausscheidung unter normalen Bedingungen gemessen. Den Urin über Nacht (falls Sie „müssen“) sammeln und mit dem ersten Morgenurin kräftig durchschütteln und das Röhrchen befüllen.

## II. Provokationstest:

Am nächsten Tag abends vor dem Schlafen auf leeren Magen (d.h. 3-4 Stunden nach dem Abendessen) beide DMSA Kapseln mit Wasser einnehmen und das Zäpfchen in den Darm **tief** einführen. Vorher die Blase entleeren!

Den Urin über Nacht (falls Sie „müssen“) und mit dem ersten Morgenurin kräftig durchschütteln und das Röhrchen befüllen.

Achten Sie darauf, dass der Behälter sauber bleiben muss. Nicht mit Wasser spülen oder für andere Zwecke verwenden!

Das Röhrchen mit dem Aufkleber versehen und in den Transportbehälter stecken. Zusammen mit dem Anforderungsschein in die Versandtasche geben und verschließen. Die Versandtasche bitte mit Euro 2,20 Porto versehen.



**Microtrace Minerals**  
**Röhrenstr 20**  
**D-91217 Hersbruck**  
**Tel.: 09151-4332**

Viel Erfolg!



**Dr. med. dent. Victor Schlee**  
**Dr. med. dent. Louis Niestegge**  
Zahnärzte